

Tumorações remissivas múltiplas: a evolução de um câncer de ovário

Joao Ormino Beltrão Barros ¹, Henrique Augusto Nascimento², Lanna Tarce de Moraes², Victoria Reis Silva², Rayane Carneiro Amorim², Paula Daher Rassi².

1 – Discentes do curso de Medicina da Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica.

2 – Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica.

RESUMO: É descrita evolução de um caso de câncer de ovário e suas tumorações remissivas múltiplas, enumerando durante 13 anos os diagnósticos diferenciados. Aos 45 a.i. paciente apresentava um quadro aumento em ovário direito detectado em Ultrassonografia (USG) abdominal, tendo como diagnostico tumor “borderline” do ovário, realizando ooforectomia total direita. Oito anos após o ocorrido foram detectadas intrabdominalmente focos carcinomatosos múltiplos em todos os quadrantes, recebendo diagnóstico de linfadenomegalia em região ilíaca esquerda, e mais tardiamente, positivo para metástases pélvicas e diafragmáticas. Enfatiza-se que o câncer de ovário representar um importante fator de morbimortalidade entre as mulheres e seu rastreo por exames de imagem permanece imprescindível para auxiliar no reconhecimento precoce e tratamento com melhores prognósticos.

Palavras-chave:

Neoplasia.
Ginecologia.
Metástase